

ΠΗ  
C19/jf  
Canadian Journal of  
**Forest**  
**Research**

*Special Issue: Wood Quality, IUFRO Division 5  
Conference, Estoril, Portugal, 8–13 July 2012*

**Revue canadienne de  
recherche  
forestière**

*Numéro spécial : Qualité du bois, Conférence du IUFRO  
Division 5, Estoril, Portugal, 8–13 juillet 2012*

**Volume 44**  
Number 2 / Numéro 2  
February / Février  
2014

[www.nrcresearchpress.com](http://www.nrcresearchpress.com)

An NRC Research  
Press Journal  
Une revue de  
NRC Research  
Press



# Canadian Journal of Forest Research

Volume 44, Number 2, February 2014

**Special Issue: Wood Quality,  
IUFRO Division 5 Conference,  
Estoril, Portugal, 8–13 July 2012**

J. Pereira, J. Xavier, J. Morais, and J. Lousada

Luciane Paes Torquato, David Auty,  
Roger E. Hernández, Isabelle Duchesne,  
David Pothier, and Alexis Achim

Olav Høibø, Geir I. Vestøl, Carolin Fischer,  
Ludvig Fjeld, and Audun Øvrum

Riikka Piispanen, Jaakko Heinonen,  
Sauli Valkonen, Harri Mäkinen,  
Sven-Olof Lundqvist, and Pekka Saranpää

Stefan M. Stangle, Franka Brüchert,  
Ursula Kretschmer, Heinrich Spiecker,  
and Udo H. Sauter

# Revue canadienne de recherche forestière

Volume 44, numéro 2, février 2014

**Numéro spécial : Qualité du bois,  
Conférence du IUFRO Division 5,  
Estoril, Portugal, 8–13 juillet 2012**

v

ARTICLES

107–117

INTRODUCTION / INTRODUCTION

ARTICLES

Assessing wood quality by spatial variation of elastic properties within the stem: Case study of *Pinus pinaster* in the transverse plane

118–127

Black spruce trees from fire-origin stands have higher wood mechanical properties than those from older, irregular stands

128–135

Bending properties and strength grading of Norway spruce: variation within and between stands

136–144

Wood density of Norway spruce in uneven-aged stands

145–153

Clear wood content in standing trees predicted from branch scar measurements with terrestrial LiDAR and verified with X-ray computed tomography

*Continued on inside back cover / Suite au verso*



**Front cover:** Deadwood and cardinal flower in a riparian zone located within an unharvested control area of the University of Maine's Acadian Forest Ecosystem Research Program (AFERP) experiment. The AFERP is situated in the Penobscot Experimental Forest in central Maine, USA. Image supplied by Dr. Matthew Olson, Missouri Department of Conservation.

**Page couverture :** « Bois mort et lobélia du cardinal dans une zone riveraine située dans une région témoin non exploitée faisant partie de l'expérience de l'Acadian Forest Ecosystem Research Program (AFERP) de l'Université du Maine. L'AFERP se situe dans la forêt expérimentale de Penobscot, dans le centre du Maine (É.-U.). Image fournie par Matthew Olson, Ph.D., Department of Conservation du Missouri. »



|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>S. Rosner, J. Světlík, K. Andreassen, I. Børja,<br/>L. Dalsgaard, R. Evans, B. Karlsson,<br/>M.M. Tollefsrud, and S. Solberg</b> | <b>154–161</b> | Wood density as a screening trait for drought sensitivity<br>in Norway spruce   |
| <b>Derek F. Sattler, Philip G. Comeau,<br/>and Alexis Achim</b>   | <b>162–171</b> | Within-tree patterns of wood stiffness for white spruce<br>( <i>Picea glauca</i> ) and trembling aspen ( <i>Populus tremuloides</i> ) |